

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Année 1954

T H E S E

N°
539

pour le

D O C T O R A T E N M E D E C I N E

(Diplôme d'Etat)

par

BATTINO Jean Maurice, né le 8 Juin 1927
à ~~Constantine~~ ^{Constantine}.

Présentée et soutenue publiquement le

VALEUR DU TEMPS DE HOWELL POUR LA SURVEILLANCE DU TRAITEMENT
ANTICOAGULANT PAR LES COUMARINES.

Président MONSIEUR BARIETY, Professeur.

1954

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Année 1954

T H E S E

N°

- - - - -

pour le

D O C T O R A T E N M E D E C I N E

(Diplôme d'Etat)

par

BATTINO Jean Maurice, né le 8 Juin 1927 à Constantine .

Présentée et soutenue publiquement le

VALEUR DU TEMPS DE HOWELL POUR LA SURVEILLANCE DU TRAITEMENT
ANTICOAGULANT PAR LES COUMARINES.

Président MONSIEUR BARIETY , Professeur.



DOYEN HONORAIRE :

M. Baudouin

PROFESSEURS HONORAIRES:

MM. Baudouin, Brindeau, Cadenat, Carnot, Chabrol, Chevassu, Chiray, Clerc, Delbet, Gougerot (H.), Guillan, Harvier, Laubry, Lemaître, Lemierre, Lhermitte, Lian, Loeper, Marion, Mathieu, Mocquot, Mulon, Olivier (E.), Ombrédanne, Sannié, Sézary, Tanon.

DOYEN..... Léon BINET

Membre de l'Institut

ASSESEUR..... Jean VERNE.

I. - PROFESSEURS

	MM.
Anatomie	CORDIER. (G.)
Anatomie Pathologique	DELARUE. (A.)
Bactériologie	GASTINEL. (P.)
Biologie Appliquée à L'Education physique et aux sports	CHAILLEY-BERT. (P.)
Biologie médicale	VERNE. (J.)
Cancérologie médicale et sociale	HUGUENIN. (R.)
Carcinologie	OBERLING. (C.)
Chimie médicale	POLONOVSKI. (M.)
Cliniques chirurgicales	(Hôtel-Dieu BROCQ. (P.)
	(Broussais DE GAUDART-D'ALLAINES
	(Salpêtrière MONDOR. (H.)
	(Cochin QUENU. (J.)
Clinique chirurgicale réparatrice et orthopédique	MERLE D'AUBIGNE. (R.)
Clinique de cardiologie	DONZELOT. (E.)
Clinique de chirurgie infantile et d'orthopédie	FEVRE. (M.)

Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire		MONOD. (R.)
Clinique de la tuberculose		BERNARD. (E.)
Clinique de neuro-chirurgie		PETIT-DUTAILLIS. (D.)
Clinique de puériculture		LELONG. (M.)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques		DEGOS. (R.)
Clinique des maladies du sang		CHEVALLIER. (P.)
Clinique des maladies du système nerveux		ALAJOUANINE. (T.)
Clinique des maladies des enfants		DEBRE. (R.)
Clinique des maladies infectieuses		MOLLARET. (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale		DELAY. (J.)
Clinique du diabète sucré et des maladies de la nutrition		BOULIN. (R.)
Clinique gynécologique		FUNCK-BRENTANO (P.)
Cliniques médicales	(Hotel-Dieu	BENARD. (H.)
	(Bichat	LAROCHE. (G.)
	(Cochin	MOREAU. (R.)
	(Broussais	DE GENNES. (L.)
Clinique médicale d'hydro-climatologique thérapeutique		JUSTIN-BESANCON. (L.)
Clinique médicale propédeutique		PASTEUR VALERIE-RADOT.
Cliniques obstétricales	(Tarnier	LANTUEJOUL. (P.)
	(Baudelocque	LEVY-SOLAL. (E.)
	(Port-Royal	LACOMME. (M.)
Clinique ophtalmologique		VELTER. (E.)
Clinique oto-rhino-laryngologique		AUBIN. (A.)

Clinique physio-pathologique des problèmes alimentaires	RICHER. (C.)
Clinique psychiatrique infantile	IEUYER. (C.)
Clinique rhumatologique et sociale	COSTE.(F.)
Clinique stomatologique	DECHAU E.(M.)
Clinique thérapeutique chirurgicale	SENEQUE.(J.)
Clinique thérapeutique médicale	LEMAIRE.(A.)
Clinique urologique	FEY. (B.)
Embryologie	GIROUD.(A.)
Génétique	LAMY.(M.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie	MOUQUIN.(M.)
Histologie	CHAMPY.(C.)
Hygiène et clinique de la première enfance	CATHALA. (J.)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON.(C.)
Médecine du travail	DESCILLE.(H.)
Médecine légale	PIEDELIEVRE.(R.)
Parasitologie et histoire naturelle médicale	GAILLIARD.(H.)
Pathologie chirurgicale	N...
Pathologie exotique	LAVIER.(G.)
Pathologie expérimentale et comparée	LENEGRE.(J.)
Pathologie médicale	DARIETY.(M.)
Pathologie et thérapeutique générales	N...
Pharmacologie et matières médicales	HAZARD.(R.)
Physico-chimie médicale	DOGNON.(A.)
Physiologie	BINET.(L.)
Physique médicale	STROHL.(A.)
Radiologie médicale	DESGREZ.(H.)
Technique chirurgicale	MOULONGUET.(P.)
Thérapeutique	TURPIN.(R.)

III.- PROFESSEURS HONORAIRES ET AGREGES
 RAPPELES A L'EXERCICE
 pour le service des examens

M. Brindeau (A.)(Obstétrique), Gatellier(J.)(Clinique Ch.)
 Le Lorier (V.)(Obstétrique), Vaudeschal(R.)(Obstétrique)

IV. - PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES
 CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE
 à titre permanent.

	MM.		MM.
Clinique chirurg.	AMELINE LENEGAUX PATEL SICARD	Chirurgie médicale	HAGUENAU MARCHAL OULIE
		Clinique obstetric.	DIGONNET ECALLE
Clinique médicale	BROUET CACHERA GARCIN	Clinique ophtalmo. clinique urologique	RENA RD COUVELAIRE

Secrétaire Général de la Faculté : M. MOREL
 Secrétaire : Mlle CHAMBERUILL

Conservateur, chargé de la direction : Docteur HAHN
 Conservateur : Mlle GOICHON

Bibliothécaires : Mlles DUMAISRE, LE NOIR
 METIN, QUIEVREUX.

Par délibération en date du 9 décembre 1793, l'Ecole a arrêté
 que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront
 présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs
 et qu'elle n'entend aucune approbation ni improbation.

A mes parents

A ma femme

A ma fille.

A Monsieur le Professeur BARIETY

qui me fait le grand honneur d'accepter la
présidence de cette thèse.

A mon Maître

Monsieur le Docteur J. FACQUET

Médecin des Hopitaux de Paris .

qui m'a inspiré le sujet de cette thèse
qu'il veuille accepter mes plus vifs remerciements
pour l'aide précieuse qu'il m'a apportée ici comme
ailleurs et pour l'incomparable enseignement dont
il m'a fait bénéficier.

A mes Maîtres dans les Hopitaux

Externat

M. le Professeur P. BROcq

M. le Professeur Agrégé F. POILLEUX

M. le Docteur LEREBoullet

M. le Professeur Agrégé M. DEPARIS

M. le Docteur J.A. LIEVRE

M. le Docteur R.EVEN

M. le Docteur J. CAROLI

M. le Docteur L. ROQUES

M. le Docteur J. FACQUET.

A tous les miens

A tous mes Amis

A mon Ami Paul Maiden

La pratique des tests de coagulation chez les malades traités par le dicoumarol et ses dérivés, a montré qu'il existait en général une corrélation entre le temps de Howell, c'est à dire du temps de coagulation d'un plasma oxalaté recalcifié, et les résultats du test de tolérance à l'héparine in vitro, tel que l'ont proposé J.P. Scallier, A.G. De Balloch.

Il nous a donc paru intéressant de vérifier la fréquence réelle de cette constatation, donc sa valeur.

Pour ce faire, nous avons repris un certain nombre d'examen de coagulation, faits suivant des techniques identiques.

La plupart proviennent du Laboratoire des Docteurs L. Vergne et J. Vergne Peindereault qui ont bien voulu nous communiquer leurs résultats, échelonnés entre Avril 1953 et Février 1954.

Quelques uns ont été pris chez des malades traités et suivis dans le service de l'Hôpital Tenon, de notre Hôpital, le Docteur J. F. Guet.

Sans idée préconçue, nous avons donc entrepris l'étude de 256 cas qui montraient tous une hypocoagulabilité, soit par le temps de Howell et par le test de tolérance à l'héparine, soit par les deux.

On considère aussi l'activité prothrombinique du plasma de ces malades.

On néglige délibérément leur histoire clinique.

En tout cas, tous sont soumis à un traitement anticoagulant par dicoumarol ou ses dérivés.

L'intérêt de cette confrontation vient de ce que les examens ont été traités suivant la même technique, par les mêmes personnes.

TECHNIQUE UTILISEE

Le sang est prélevé par ponction veineuse franche, avec une aiguille de grosse section, sur oxalate sec.

Le flacon est retourné plusieurs fois, mais non agité violemment afin d'éviter la libération de thromboplastine plaquettaire.

Puis il est centrifugé cinq minutes à 2.600 tours minutes.

Le plasma ainsi obtenu est versé dans 4 tubes à hémolyse parfaitement propre, à raison d'1 cm³ par tube.

Dans le 1er tube on n'ajoute rien: il servira pour le temps de Howell.

Dans les 3 autres on verse 3 concentrations d'héparine, telles que 0,1 cm³ égale respectivement 0,3 - 0,7 et 1 unité d'héparine.

Tous les tubes sont mis dans un bain-marie à 37°.


Le début du test est marqué par l'addition de Calcium.

On comparera toujours les résultats avec ceux obtenus chez un témoin normal.

On considère que la coagulation est obtenue lorsque le plasma est pris en masse. On vérifie toutes les 15".

Un certain nombre de précautions sont indispensables:

- les conditions dans lesquelles s'effectue la coagulation doivent être rigoureusement constantes d'un examen à l'autre et au cours du même examen. En particulier la température devra toujours être maintenue identique, de préférence à 37°.



- La verrerie, elle aussi, doit être standardisée dans ses qualités et son diamètre. Sa propreté doit être absolue. Il faut débarrasser les tubes de toutes traces de matière organique dont l'adhérence est telle que le nettoyage au goupillon est insuffisant. La destruction de toute saillure organique sera assurée par le chauffage au rouge et le séjour dans un mélange sulfochromique puissamment oxydant.

- La solution d'héparine doit avoir une action constante. Il semble que le mieux soit d'utiliser la même héparine provenant du même stock, pour un grand nombre d'examens. Elle sera en général préparée d'avance, et entreposée à la glacière en ampoules scellées.

- L'appréciation du terme de la coagulation varie notablement suivant les opérateurs. Aussi ~~est~~il souhaitable de faire exécuter tous les examens par la même personne.

RÉSULTATS CHEZ LES SUJETS NORMAUX PRIS COMME TÉMOINS.

LE TEMPS DE HOWELL:

est remarquablement fixé.

En effet, autour d'un chiffre moyen qui est de 2'30", les écarts les plus courants sont de 30", c-à-d. de 20% en plus ou en moins. En d'autres termes, la très grande majorité des temps de Howell est comprise, chez les témoins, entre 2' et 3'.

Il y a des variations minimales : sur 204 temps de Howell seulement 4, c-à-d. moins de 2% ne sont pas compris entre 2 et 3'.

Ils sont tous 4 inférieurs à 2'.

L'un est de 1'55" c-à-d. un écart minime.

Les 3 autres sont de 1'45", c-à-d. avec un écart de 15" seulement sur le chiffre limite inférieur de la moyenne.

Il faut insister sur la fixité remarquable du temps de Howell.

Les écarts maxima autour du chiffre moyen de 2'15" ne dépassent pratiquement jamais 20% en plus ou en moins.

Considérons maintenant les résultats que donne le test de tolérance à l'héparine in vitro (T.T.H.) chez les témoins.

T.T.H. : CHEZ LES TEMOINS

- Avec la dilution d'héparine à 0,3 unité

Le temps moyen est de 3'30''.

Si on considère, là encore, les variations de 20 % en deçà et au delà de ce chiffre, comme des variations entrant dans le cadre de la normale, celle-ci sera comprise entre 2'45'' et 4'15''.

On aura 7 chiffres s'écartant de ces limites, c-à-d. moins de 4 % . Ces sept résultats sont tous supérieurs à 4'15''. 6 d'entre eux sont de 4'30''. Un seul est de 5'.

On voit donc que, là encore, les écarts sont rares et peu importants.

- Avec la dilution d'héparine à 0,7 unité

Dans ce cas, le temps moyen est de 5'30''.

Les écarts moyens (20 % en + ou en -) seront donc 4'30'' et 7'. Le nombre des chiffres s'écartant de ces moyennes est de 15, soit 3,5 % du total des examens. Les chiffres extrêmes sont respectivement 3'15'' et 9'15''.

On voit donc que les chiffres sont moins fixes que précédemment, les variations plus grandes et plus nombreuses.

- Avec la dilution d'héparine à I unité

Le chiffre moyen est de 9'.

Les écarts moyens (20% en + ou en -)
seront donc 7' et 11'.

Le nombre de chiffres s'écartant de ces moyennes est de 27, soit 13,5 % du total.

Les chiffres extrêmes sont: 16' et 5'.

On voit donc que , avec la dilution d'héparine à I unité les écarts sont nombreux et importants.

En conclusion:

il semble que, remarquablement fixes avec le temps de Howell, les temps de coagulation obtenus avec des dilutions croissantes d'héparine donnent des écarts d'autant plus nombreux et d'autant plus grands que la dilution croît.

RAPPORTS ENTRE ACTIVITE PROTHROMBINIQUE DU PALSMA
ET EPREUVES DE COAGULABILITES GLOBALE.

Pour la majorité des auteurs (J. Lenègre, A. Gerbaux, L. Beaumont, J.P. Soulier, et A.G. Le Bolloch en particulier en France), il apparaît des modifications de la coagulabilité globale seulement lorsque le taux de prothrombine (mesuré par la méthode en un temps de Quick) est au-dessous de 30 %.

Ces auteurs en concluent, d'accord en cela avec la majorité des auteurs américains (F. Jorpes, EW. Allen, F.L. Munro), qu'un traitement anticoagulant par les coumarines doit abaisser le taux de prothrombine au dessous de ce chiffre.

Nous allons donc voir, à partir de nos 256 cas d'hypocoagulabilité :

1) les résultats des épreuves de coagulation :

- quand le taux de prothrombine est entre 50 et 30%.
- quand " " " " 30 et 10%.
- quand il est inférieur à 10%.

2) comparer les taux de PT. et les épreuves de coagulabilité:

a) le temps de Howell.

b) le T.T.H.

- quand ils montrent une hypocoagulabilité du degré I
- " " " " du degré II
- " " " " du degré III.

Les degrés de coagulation sont déterminés à partir d'un indice qui est le rapport temps de coagulation du malade
temps du témoin.

Si, par exemple, le temps de Howell du témoin est de 2' et celui du malade est de 4', l'indice sera de $4/2 = 2$.

P. Cohen, S. Ethier et R. Froment ont également défini un indice de coagulabilité. Mais cet indice est représenté par le rapport du temps du témoin / temps du malade. Il a l'avantage de donner des chiffres supérieurs à 1 pour hypercoagulabilité.

Comme notre but est d'étudier l'hypocoagulabilité, nous avons préféré inverser le rapport.

Nous appellerons donc :

- degré I : indice compris entre 1,2 et 1,5
- degré 2 : " " " 1,5 et 2.
- degré 3 : indice supérieur à 2.

I) LE TAUX DE PROTHROMBINE EST PRIS COMME REFERENCE:

A) Comparaison avec le temps de Howell

- a) La prothrombine est comprise entre 50 et 100% - 63 cas.
 - dans 51 cas coagulation normale.
 - dans 27 cas hypocoagulabilité degré I.
 - dans 5 cas " " degré II.
 - Aucune hypocoagulabilité de degré III.

b) la prothrombine est comprise 30 et 10%: 80 cas

17 cas : coagulabilité normale

28 cas : hypocoagulabilité degré I.

30 cas : " degré II.

5 cas : " degré III.

c) la prothrombine est inférieure à 10%: 23 cas

1 cas : coagulabilité normale

5 cas : hypocoagulabilité degré I.

6 cas : degré II.

11 cas : degré III.

B) Comparaison avec le T.T.H. (dilution à 1 unité).

a) le taux de prothrombine est compris entre 50 et 30 %.
63 cas

30 cas : coagulabilité normale

17 cas : hypocoagulabilité degré I.

14 cas : degré II.

2 cas : degré III.

b) le taux de prothrombine est compris entre 30 et 10%
80 cas.

23 cas : coagulabilité normale

20 cas : hypocoagulabilité degré I.

29 cas : degré II.

8 cas : degré III.



c) le taux de prothrombine est inférieur à 10 %:
23 cas.

Cas de coagulabilité normale

2 cas d'hypocoagulabilité de degré I.

8 cas degré II.

12 cas de gré III.

En conclusion on voit donc que la coagulabilité, suivie par le temps de Howell, par le T.T.H. ne suit pas exactement les variations de la prothrombine.

On voit également qu'il faut atteindre des taux bas de prothrombine pour obtenir des hypocoagulabilités nettes, et que les taux les plus favorables pour atteindre une hypocoagulabilité nette sans être exagérée doivent être compris entre 30 et 10 %.

Enfin, à taux de prothrombine équivalent, l'indice de coagulabilité est plus élevé avec le T.T.H. qu'avec le Howell.

I) L'INDICE DE COAGULABILITE EST PRIS COMME REFERENCE

A) On utilise le temps de Howell

a) indice compris entre 1,2 et 1,5: 107 cas.

35 cas: prothrombine supérieure à 50 %

42 cas: comprise entre 50 et 30%

26 cas: 30 et 10%

4 cas: inférieure à 10 %


b) indice compris entre 1,5 et 2: 57 cas.

11 cas: prothrombine supérieure à 50 %

Il cas: comprise entre 50 et 30%

29 cas: 30 et 10%

6 cas: inférieure à 10 %



c) l'indice est supérieur à 2 : 16 cas.

1 cas où la prothrombine est supérieure à 50%.

2 cas : comprise entre 50 et 30%

4 cas : 30 et 10%

9 cas : inférieure à 10 %.

B) On utilise le T.T.H.

(dilution à 1 unité)

a) indice compris entre 1,2 et 1,5 : 69 cas.

22 cas: prothrombine supérieure à 50%

28 cas: comprise entre 50 et 30%

18 cas: 30 et 10%

1 cas: inférieure à 10 % .

b) indice compris entre 1,5 et 2. : 70 cas.

12 cas; prothrombine supérieure à 50%

19 cas: comprise entre 50 et 30 %

32 cas: 30 et 10 %.

7 cas: inférieure à 10 %.

c) indice supérieur à 2 : 24 cas.

0 cas: prothrombine supérieure à 50 %

2 cas: comprise entre 50 et 30 %

11 cas: entre 30 et 10 %

11 cas: inférieure à 10 %.

II CONCLUSION

Cette étude comparative de l'indice de coagulabilité fournie par le T.T.H. et des taux de prothrombine confirme bien:

- qu'il n'y a pas de relation absolue entre le taux de prothrombine et la coagulabilité globale,
- qu'il est nécessaire d'abaisser parfois considérablement le taux de prothrombine pour avoir une hypocoagulabilité.

Nous envisagerons pour finir l'étude comparative des indices de coagulabilité fournis respectivement par le Howell et le T.T.H.

Nous prendrons comme points de comparaison :

- d'abord le temps de Howell
- puis le T.T.H. (dilution I unité).

ETUDE COMPARATIVE DES INDICES DE COAGULABILITE.

A) LE TEMPS DE HOWELL EST PRIS COMME REPERE

a) Degré I - 107 cas.

Le T.T.H. montre :

29 cas coagulabilité normale.

44 cas indice degré I.

55 cas degré II.

1 cas degré III.

b) Degré II - 57 cas.

Le T.T.H. montre :

4 cas coagulabilité normale.

12 cas indice degré I.

29 cas degré II.

: 12 cas degré III.

c) Degré III - 16 cas.

Le T.T.H. montre :

0 cas coagulabilité normale.

0 cas indice degré I.

4 cas degré II.

12 cas degré III.

B) LE T.T.H. EST PRIS COMME REFERE.

) Degré I - 69 cas.

Le Howell montre :

16 cas de coagulabilité normale.

41 cas indice degré I.

12 cas degré 2.

1 cas degré III.

b) Degré II - 70 cas.

Le Howell montre :

5 cas coagulabilité normale.

34 cas indice degré I.

27 cas degré II.

4 cas degré III.

c) Degré III - 24 cas.

Le Howell montre :

0 cas coagulabilité normale

1 cas indice degré I.

12 cas d gré II.

11 cas degré III.

EN CONCLUSION:

En gros le Howell et le T.T.H. . rient dans le même sens.

Mais pendant le test de Howell semble plus inerte que le T.T.H.

On peut par exemple dire que, sur un sang donné, un indice de

coagulabilité fourni par le T.T.H. compris entre 1,5 et 2 corres-

pondrait à un indice fourni par le Howell compris entre 1,3 et 1,6.

C'est dire l'intérêt du temps de Howell, épreuve facile, rapide et fidèle pour la surveillance des traitements anticoagulants.

DISCUSSION DES FAITS PRESENTES.

Dans les pages qui précèdent, nous avons exposé des faits
ruts, fait des comparaisons de chiffres.

Nous allons maintenant envisager les problèmes posés par ces
its :

I) Discordances entre le taux de prothrombine mesuré par la
éthode de Quick et les mesures de coagulabilité globale.

Ces discordances peuvent être discutées sur les bases suivantes

Le prothrombine n'est pas l'unique facteur de coagulation,
nt s'en faut.

Du reste, E. Warner, K. Brinkhous et H. Smith ont montré que
e plasma des mammifères contient un très grand excès de prothrombine.

Ainsi, une baisse du taux de prothrombine à par exemple 10%
e provoquera pas dans différents plasmas des modifications semblables
a temps de coagulation, probablement du fait de la variabilité des
autres facteurs de la coagulation dans ses divers échantillons.

On ne peut donc fixer à l'avance le taux de prothrombine
ceptible de provoquer une hypocoagulabilité. Il sera variable avec
aque cas.

Les faits cliniques sont, du reste, venus corroborer ces
pothèses. C'est ainsi que J.P. Soulier et A.G. Le Bolloch citent
ux exemples caractéristiques:

- Celui d'un malade ayant présenté une thrombose malgré un
ux de prothrombine à 7%.

- L'apparition d'une hémorragie malgré un taux de prothrombine
70%.

Ainsi est prouvé l'intérêt de la comparaison à chaque fois du taux de prothrombine et d'une mesure correcte de la coagulation.

D'où le second problème :

II) Quelle est la valeur respective du temps de Howell et du TTH.

Le reproche essentiel qui a toujours été fait au temps de Howell est sa courte durée. En effet, de nombreux auteurs soutiennent qu'étant donné la courte durée de l'expérience, une erreur faible dans la détermination de la fin de coagulation aura une incidence considérable dans l'appréciation des résultats.

Au contraire, toujours d'après les mêmes auteurs (JP. Soulier et AG. Le Bolloch.) , (J. Lenègre, A. Gerbaux et JL. Beaumont.) , l'adjonction d'héparine permet d'allonger la durée de la coagulation, donc de rendre l'erreur moins considérable; en pourcentage du moins; de plus elle démasquerait un éventuel excès en facteurs coagulants, thrombo-plastine en particulier. Et cet excès, véritable signature de la maladie thrombo-embolique et de son hypercoagulabilité, serait démasqué par la discordance entre le taux de prothrombine et l'effet de son abaissement sur la coagulabilité globale, appréciée par le T.T.H.

EN FAIT :

Nous avons vu, chez les témoins la remarquable fixité du temps de Howell, et les variations relativement importantes du T.T.H. chez ces mêmes sujets.

D'autre part, l'adjonction d'héparine rend la fin du phénomène particulièrement difficile à saisir et augmente l'imprécision de la mesure.

En effet, la coagulation est acquise lors de l'apparition d'un coagulum fibrineux.

Or, l'étude photographique de la coagulation du plasma in vitro (P. Chevallier, A. Guillot, et A. Piehrer.) a montré que la structure du caillot est différente avec un plasma normal et un plasma hépariné. La coagulation se produit à partir de centres dont le nombre est très grand dans le plasma normal et faible dans le plasma hépariné.

De même, l'étude photométrique de la coagulation plasmatique (C. Lina, J. Faquet; R. Sessier, G. Huret, P. Heunier et A. Dreyfuss) a montré l'influence des divers facteurs de la coagulation sur le phénomène.

Cette méthode est basée sur le fait que l'apparition de la fibrine entraîne une augmentation de l'opacité du milieu que l'on peut, au photomètre, apprécier, suivre et mesurer par la différence des densités optiques.

On obtient une courbe en S caractéristique des réactions autocatalytiques accélérées.

La fin du phénomène correspond au moment où a été effectuée la première lecture du chiffre définitif et stable de la densité optique. Or, dans ces mesures d'opacités, l'apparition d'un caillot dans la cuve correspond à un point essentiellement variable sur la courbe photométrique, qui continue à s'élever pendant un temps plus ou moins long.

Dans les caillots légers, et nous avons vu que c'est le cas des plasmas additionnés d'héparine, l'apparition du caillot correspond à un point très élevé sur la courbe photométrique. C'est à dire que la coagulation a commencé déjà depuis un temps d'autant plus long que l'hypocoagulabilité est plus grande.

On voit donc que le T.T.H. comporte un certain nombre d'inconvénients auxquels échappe le temps de Howell.

Il résulte donc :

- des chiffres rapportés et de leur comparaison
- de la discussion qui a suivi

que le temps de Howell constitue une mesure valable de la coagulabilité globale.

Il mérite donc, du fait de sa simplicité, d'être retenu également pour la surveillance des traitements anticoagulants par le dicoumarol et ses dérivés.

BIBLIOGRAPHIE

- Allen (E.W.) Clinical use of anticoagulants. Treatment with cumarol of 1686 post operative cases.
- A.M.A. 1947 134 323.
- I) BERTRAND (J.) et QUIVY (D.) Etude analytique des thrombogrammes. Autocalyse dans la coagulation plasmatique. Rev. Hémato. 1946 I 278.
- II) BERTRAND (J.) et QUIVY (D.) Analyse des thrombogrammes relatifs aux plasmas fortement héparinés. Revue de Physique 1947 39 483.
- III) BEAUMONT (JL.) et LENEGRÉ (J.) La coagulabilité du sang dans l'insuffisance cardiaque avant et après le traitement. H.P. 27 2128 1951.
- IV) BEAUMONT (JL.) et LENEGRÉ (J.) La crase sanguine dans les thromboses des artères coronaires et pulmonaires. Déductions thérapeutiques. Revue d'Hémato 7.1952.
- V) BEAUMONT (JL.) GERBAUX (A) et LENEGRÉ (J.) Les thromboses veineuses et leur traitement (suivi par le test de tolérance à l'héparine in vitro.) P.M. 59 79 1951.
- VI) BONPARIS (A.) Thèse Médecine Paris 1951.
- VII) BURSTEIN (M.) La coagulation du sang. Monographie du Centre National de Transfusion sanguine (Masson. Paris - 1949 .)
- VIII) CHEVALLIER (P.) GUILLOT (M.) et FIEHRER (A.) Méthode photographique d'étude de la coagulation du plasma in vitro. Sang 1946 17 230.
- IX) DEJARDIN , MASCART et DELWART. La résistance à l'héparine. Acta Chirurgica Belgica.

II) CAHEN (M.) ITHIER (J.) FROMENT (R.) Indice de coagulabilité
du sang. Arch. Mal. Coeur Vaisseaux 1952.

12) FACQUET (J.) SASSIER (R.) KISCH (R.) Action de la dicoumarine
sur la prothrombinémie et la coagulation plasmatique chez l'adulte
normal.

Compte rendu Soc. Bic. 10 Mars 1945 262.

13) FEISSLY (R.) Estimation de la thromboplastine plasmatique.
J. Suisse de Médecine 1947 77 427.

14) GERBAUX (A.) BEAUMONT (JL.) et LENEGRÉ (J.) Accidents hémorragie
tiques du dicoumarol. P.M. 21/12/51. 1555.

15) HAGEDORN (AB.) et BARKER (N.) Coagulation time of blood hepari-
zied in vitro. Correlation of resultat with those of the heparine
tolerance test.

J. Lab. Clin. Med. 1947 32 1087.

16) HAGEDORN (AB) et BARKER (N.) Responses of persons with and with-
out intra-vascular thrombosis to a heparine tolerance test.
M. Heart. J. 1947.

17) HOWELL (W.H.) Test Book of Physiologie (1918)

18) JORPS (E.) Traitement des thrombosses par les anticoagulants.
H.P. 1948 24 1686.

19) KRAVCHICZ (DJ.) SHEIMANN (L.) Evaluation of an in vitro heparin
tolerance test for thrombo-embolic disease.

J. Lab. Clin. Med. 1949 34 1222.

20) LIAN (C.) SASSIER (R.) et HURET (G.) La coagulation du sang.
Etude Thrombographique.

1942 491.

-) EUNIER (P.) et BREYFUSS (A.) Analyse photométrique de la
agulation plasmatique.
11. Soc. Ch. Bio. 1940 22 529
-) QUICK (A.J.) The anticoagulants effective in vivo with special
ference to heparin and dicumarol.
ys. Review. 1944 24 297.
-) QUICK (J.) Etat actuel de nos connaissances sur la prothrombine.
sang 1946 17 282.
-) ROSENBAUM (DE.) A test of coagulation time of blood heparinized
vitro. Studies of normal subjects and of patients with intra-vascular
rombosis. J. Lab. Cli. Med. 1948 33 1342
-) SILVERMAN. Modification of the Wough - Ruddick test.
ood 1948 5 147
-) SOULIER (JP.) et GUEGUEN (J.) Action de la Phényl-indane - dione
e le taux de la prothrombine.
vue d'Hémo. 1948 3 180
-) SOULIER (JP.) et le BOLLOCH (J.) Le test de tolérance à l'hépa-
in vitro. Revue d'Hémo. 5 148 1950.
-) SOULIER (JP.) Modifications apportées au test de tolérance à
néparine in vitro.
H. P. 27 775 1951.
-) SOULIER (JP.) et le BOLLOCH (J.) Le test de tolérance à l'hépa-
in vitro dans le contrôle du traitement par le dicumarol.
sang. 22 122 1951.
-) LE TAKATS (G.) Heparin tolerance test for clotting mechanism
G. O. 77 39 1943.

31) TZANK (A.) et SOULIER (JP.) Une représentation schématique de la coagulation sanguine.

S.H.P. 1947 7 37.

32) WARNER (E.) BRINKHOUS (K.) et SMITH (A.) A quantitative study on blood clotting; prothrombin fluctuations under experimental conditions.

AM. J. Phys. 1936 114 667 .

33) WAUGH (TR.) et RUDDICK (DW.) A test increased coagulability of the blood. Can. Med. Ass. J. 50 547 1944.

34) WAUGH (TR.) et RUDDICK (DW.) Studies on increased coagulability of the blood. Can. Med. Ass. 51 II 1944.

35) WHITTAKER (J.) The effect of temperature on the Waugh - Rud-dick test for increased coagulability of the blood.

Can. Med. Ass. J. 52 185 1945.

C O N C L U S I O N .

- Examen des chiffres fournis par 256 mesures de coagulabilité.
- Résultats obtenus chez les témoins :

Par le test de HOWELL :

Fixité remarquable - 204 cas ; 200 cas où le temps est compris entre 2' et 3' ; 4 cas seulement qui dépassent ces limites, soit moins de 2% du total.

Par le test de tolérance à l'héparine :

Variabilité d'autant plus nette que la dilution est plus faible. Ainsi, avec la dilution à 1 unité, 13% des cas s'écartent des valeurs moyennes entre 7' et 11'.

- Variabilité du temps de QUICK pour une coagulabilité donnée.

Inversement variabilité de la coagulation pour un taux de prothrombine donné.

- Comparaison des indices de coagulabilité fournis par :

. le test de Howell.

. le test de tolérance à l'héparine.

Concordance fréquente mais non constante des résultats.

Lorsqu'il y a discordance, l'indice fourni par le test de Howell est légèrement plus faible.

- Valeur du temps de HOWELL pour la surveillance du traitement anticoagulant par les coumarines.

Permis d'imprimer le 3 Juin 1954.

Vu :

Le Président :

Signé: A. Bariéty.

Vu:

Le Doyen ,

Signé: L. Binet.

Vu

et Permis d'imprimer :

LE RECTEUR
de l'UNIVERSITE DE PARIS.

J. Sarraille.

